

LEGENDA

Boschi misti mesofili submontani a latifoglie decidue miste (*Quercetalia pubescens-petraea* Klika 1933)

Boschi mesofili, montani a latifoglie con dominanza di faggio (o occasionalmente di ontano bianco) (*Fagetalia sylvaticae* Pawl. 1928)

Fc - *Cardamine heptaphyllae*-*Fagetum sylvaticae*

Tb - *Cardamine heptaphyllae*-*Fagetum sylvaticae* var. a *Taxus baccata*

Fa - *Gymnocarpio*-*Fagetum sylvaticae*

Fa - popolamenti frammentari riferibili al *Fagetalia sylvaticae*

Al - *Alnetum incanae*

Boschi di origine antropica

Sa - *Salicetum albae*

Ba - Boschi artificiali

Arbusteti, siepi e mantelli forestali submontani e montani (*Rhamno cataractae*-*Prunetea spinosa* Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tuxen 1947)

Ps - Fitocenosi riferibili al *Prunetalia spinosa*

Cz - fitocenosi a *Corylus avellana*

Fitocenosi erbacee ed arbustive delle schiarite dei boschi montani (*Epilobietea angustifolia* R. Tuxen et Preisling ex v. Rochow 1951)

Ri - *Rubetum idaei*

Cu - *Calluno-Sarcocornetum*

Pt - fitocenosi a *Pteridium aquilinum*

Arbusteti basali montani (brughiere) di tipo subatlantico e mediterraneo (*Calluno-Ulmetea* Br.-Bl. et R. Tuxen ex Klika et Hadač 1944)

Ci - *Genisto pilosae*-*Callunetum*

Ng - *Carlinio caulescentis*-*Nardetum strictae*

Prati da sfalcio e prati-pascoli montani (*Arrhenatheretalia* Koch 1928, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Cynosurion cristati* Tuxen 1947)

Ar - *Centaurio nigrescentis*-*Arrhenatheretum elatioris*

As - *Centaurio nigrescentis*-*Arrhenatheretum elatioris* sottotipo a *Bromus erectus* e *Brachypodium genivense*

Cy - *Festuca commutatae*-*Cynosuretum cristati*

Prati montani inondati (*Molinietalia* Koch), in conche o depressioni umide (*Molinia caerulea* Koch 1920) o in zone di espansione di corsi d'acqua (*Callithion* R. Tuxen 1937 em. Balatová Tuliáková 1979) e prati montani periodicamente inondati su suoli costipati per disturbo antropico (*Potentillo-Polygonetalia* R. Tx. 1947)

Cd - *Juncus articulati*-*Caricetum distantis*

Gj - *Juncus alpinofortis*-*Caricetum nigrae*

Ys - *Scirpsetum sylvatici*

De - fitocenosi a *Deschampsia caespitosa*

Eu - fitocenosi a *Equisetum palustre*

Em - *Equisetum palustre*-*Menyanthes longifoliae*

H - fitocenosi a *Carex hirta*

Vegetazione erbacea pioniera semiruderale di habitat aridi o semiaridi che colonizza con grande rapidità suoli ricchi in basi e argillosi (*Agropyretalia repens* Oberdorfer, Müller & Görs in Oberdorfer, Görs, Komack, Lohmeyer, Müller, Philipp & Schöberl 1967a,b,c,d,e ex Kopecký)

Dc - *Daucus carota*-*Tusilaginetum terfense*

Ch - *Chaerophylletum auri*

Cq - *Chaerophyllo-Petasitetum officinalis*

Us - *Urtica dioica*-*Sambucetum ebuli*

Pascoli magri montani e subalpini a nardo e/o brachipodio (*Caricetalia curvulae* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926, *Nardion strictae* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926)

Na - *Viola ferrarii*-*Nardetum strictae*

Fn - fitocenosi a *Festuca nigrescens*

Bg - *Carlinio caulescentis*-*Brachypodietum genuense*

Praterie semixerofitiche montane (*Brometalia erecti* Br.-Bl. 1936, *Bromion erecti* Koch 1926)

Bb - fitocenosi a *Brachypodium genivense* e *Bromus erectus*

Bo - fitocenosi a *Brachypodium genivense* e *Thymus pulegioides*

Vegetazione di torbiere basse mesotrofiche acidofile (*Caricetalia nigrae* Koch 1926 em. Br.-Bl. 1949 nom. mut. propos. ex Steiner 1952) e basifile (*Caricetalia davallianae* Br.-Bl. 1949)

Cr - *Caricetum rostratae*

Mt - fitocenosi a *Menyanthes trifoliata*

Eg - fitocenosi ad *Eriophorum angustifolium*

Lt - *Eriophorum latifolium*

Eq - *Eleocharitetum quinqueflorae*

Vegetazione riparia ad eufite di pozze e piccoli laghi montani (*Phragmito-Magnocaricetalia* Klika in Klika et Novák 1941) comprensiva di fitocenosi paucispecifiche ad eufite di grande taglia (*Phragmiton communis* Koch 1920), di fitocenosi a grandi carici (*Wagnerion elizae* Koch) e di fitocenosi eufitiche poste al di sotto del livello superiore della lama d'acqua (*Glycerio-Spartanium* Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942)

Sc - *Scirpsetum lacustris*

Tt - *Typhetum latifoliae*

Sr - *Spartanium erecti*

Th - fitocenosi a *Thelypteris palustris*

Ce - fitocenosi a *Carex pseudocyperus*

Co - fitocenosi a *Carex rostrata*

Ci - *Caricetum paniculatae*

Sm - fitocenosi a *Spartanium emersum*

Ca - *Caricetum vesicariae*

Me - *Equisetum palustre*-*Menyanthes trifoliatae*

El - *Eleocharitetum palustre*

Ej - fitocenosi a *Equisetum telmateia*

Gp - *Glycerietum piliclae*

Vegetazione riparia ad anfitte di pozze e laghi montani (*Littorelletea* R. Tx. 1947)

Pz - fitocenosi a *Callitriche palustris*

Vegetazione a idrofite radicate sul fondo di corpi idrici stagnanti (risotipi) (*Potamogetea* R. Tx. et Preisling 1942)

Po - fitocenosi a *Potamogeton natans*

Ri - fitocenosi a *Ranunculus trichophyllus* e *Lemna minor*

Vegetazione a pleustofite galleggianti o sommerse nella colonna d'acqua di corpi idrici (*Lemnetea* de Bolos & Mascians 1955)

Vegetazione a macrofite ramificate sommerse (*Charitetes fragilis* Fukarek ex Krausch 1964)

U - fitocenosi a *Lemna minor*

Ur - *Utricularietum neglectae*

Cx - fitocenosi *Charitetea hispidae*

Re - fitocenosi a *Silene rupestris*

Fitocenosi di conifere e falde detritiche termofite montane e submontane (*Silicion calamagrostis* Br.-Bl. ex Gams 1927)

Cv - fitocenosi ad *Calamagrostis varia* subsp. Corsica

Ls - fitocenosi a *Laserpitium siler*

Fitocenosi casmofitiche delle rupi basaltiche e serpentitiche e arenacee (*Androsacetalia vandellii* Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934 corr. Br.-Bl. 1948)

Sx - fitocenosi a *Saxifraga paniculata*

Hq - fitocenosi a *Hieracium schmidii*

Sd - *Sedo dasiphyllo-Asperinetum cuneifolii*

Sy - *Sedo albi-Alyssodetum utriculariae*

Area con vegetazione prevalentemente di origine antropica e aree urbanizzate

Vd - Vegetazione erbacea instabile di ambienti disturbati

Se - Seminatrici

Au - Aree prevalentemente edificate, parcheggi, manufatti antropici, dighe

Habitat completamente privi di vegetazione

Dt - Affioramenti rocciosi o detriti completamente affittici

Laghi

La - Bacini di origine naturale o artificiale

Mosaici con stretta intersecazione tra tipi vegetazionali distinti

Mosaici tra praterie

Cj+De

Mosaici tra praterie e fitocenosi di detriti e rupi

Sx+Bo

Mosaici tra praterie e fitocenosi arbustive

Ng+Ps

Na+Ps


Cy+Cu

Cy+Ps


Bo+Ps

Bg+Ps


Bb+Ps



Dettaglio della zona del Lago Cavo (scala 1:2000)



Dettaglio della zona del Sasso Tignoso (scala 1:3000)



Provincia di Modena

SIC-ZPS IT4040005

“ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE”

Misure Specifiche di Conservazione e Piano di Gestione

CARTA DELLA VEGETAZIONE

(scala 1:10.000)

NOVEMBRE 2013

ALLEGATO A3.3